

### **Information destinée aux patients**

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste.

Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### **Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate**

#### **Qu'est-ce que Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate et quand est-il utilisé ?**

Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate est un antitussif, qui contient le principe actif butamirate. Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate calme la toux et la toux irritative lors de refroidissement. Sur ordonnance médicale, Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate peut également être utilisé pour le traitement de toux aiguës d'autres origines.

#### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

Le tabagisme contribue à la survenue de la toux (« toux du fumeur »). Vous pouvez favoriser l'action de Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate en vous abstenant de fumer.

*Information pour les diabétiques* : Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate ne contient pas de sucre ; il est édulcoré au sorbitol et à l'acésulfame.

15 ml de sirop correspondent à 73,5 kJ / 17,6 kcal, soit environ 0,3 équivalent-fruit.

#### **Quand Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate ne doit-il pas être utilisé ?**

Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate ne doit pas être administré aux enfants de moins de 2 ans.

Vous ne devez pas utiliser Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate si vous réagissez par de l'allergie au principe actif butamirate ou à un des excipients.

Vous ne devez pas utiliser Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate si vous ou votre enfant souffrez d'une perturbation congénitale du métabolisme du sucre (intolérance au fructose) ; le sirop est édulcoré avec du sorbitol, à partir duquel du fructose (sucre de fruit) peut se former durant la digestion.

#### **Quelles sont les précautions à observer lors de la prise du Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate ?**

En cas de toux persistant pendant plus de 7 jours, il y a lieu de consulter un médecin afin de préciser la cause de la toux.

En cas de toux accompagnée d'une forte sécrétion de mucosités ou d'expectorations, vous devriez utiliser un agent mucolytique (expectorant) à la place de Phytopharma sirop contre la toux avec buramirate. La sédation de la toux induite par Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate peut entraîner une accumulation indésirable de mucosités bronchiques dans les voies respiratoires, ce qui favorise la survenue d'une infection respiratoire ou d'un bronchospasme.

C'est pourquoi la prise simultanée de Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate et d'expectorants est également à éviter. Votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste vous conseillera volontiers dans un tel cas.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

### **Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Pendant la grossesse et l'allaitement vous ne devez utiliser Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate que sur l'avis du médecin.

### **Comment utiliser Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate?**

Sauf autre prescription du médecin :

Enfants de 2 à 6 ans : 3x/jour 5 ml

Enfants de 6 à 12 ans : 3x/jour 10 ml

Adolescents à partir de 12 ans : 3x/jour 15 ml

Adultes : 4x/jour 15 ml

Utiliser le gobelet doseur joint à l'emballage.

Le sirop devrait être pris si possible avant les repas ; la dernière prise avant le coucher. Il faut respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre deux prises ou administrations.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate peut-il provoquer ?**

L'utilisation de Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate peut provoquer les effets secondaires suivants : dans de rares cas, une allergie cutanée, des nausées, de la diarrhée ou des vertiges peuvent se produire.

En cas de surdosage, c'est-à-dire en cas de prise ou d'administration d'une quantité trop importante de Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate, de la somnolence, des nausées, des vomissements et de la diarrhée, mais aussi des troubles de l'équilibre et une chute de tension artérielle peuvent se produire.

En cas d'apparition accrue de phénomènes de ce genre ou si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

#### **A quoi faut-il encore faire attention ?**

Conservez Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Si vous possédez des médicaments dont la date de conservation est dépassée, veuillez les rapporter à votre pharmacien ou à votre droguiste pour qu'il les détruise.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

#### **Que contient Phytopharma sirop contre la toux avec butamirate?**

15 ml de sirop contiennent comme principe actif 22,5 mg d'hydrogénéocitrate de butamirate (correspondant à 13,95 mg de butamirate). Il contient en outre des aromatisants, les édulcorants sorbitol et acésulfame, le colorant caramel (E150), le conservateur acide benzoïque (E210) et d'autres excipients.

#### **Numéro d'autorisation**

54521 (Swissmedic)

#### **Où obtenez-vous Swidro sirop contre la toux avec butamirate?**

#### **Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

Vous obtenez Swidro sirop contre la toux avec butamirate en pharmacies et en drogueries sans ordonnance médicale.

Flacon de 200 ml

#### **Titulaire de l'autorisation :**

Phytopharma SA, Grandvillard

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **octobre 2011** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).